

HABITAT E ILUSTRACIÓN DEL SINTIPO DE
ANAEOMORPHA SPLENDIDA COLUMBIANA
NIEPELT, 1928 (LEP: NYMPHALIDAE: CHARAXINAE) PARA COLOMBIA

Julián A. Salazar E. (M.V.Z.)
Museo de Historia Natural
Universidad de Caldas

RESUMEN

En este artículo es ilustrado el sintipo de *Anaeomorpha splendida columbiana* Niepelt, 1928 con notas sobre su localización y hábitat.

PALABRAS CLAVE:

Anaeomorpha, Colombia, sintipo, hábitat, *Lepidoptera*.

ABSTRACT

In this paper the syntype of *Anaeomorpha splendida columbiana* Niepelt, 1928 are illustrated. Notes on the original location from Colombia and habitat are included.

KEY WORDS:

Anaeomorpha, Colombia, syntype, habitat, *Lepidoptera*.

NOTA INTRODUCTORIA

Anaeomorpha splendida es una bella y exquisita mariposa charaxina descrita originalmente del Río Cachyaco (Perú) por W. Rothschild en 1894. Dos años después en otro trabajo posterior, dicho autor la ilustró figurando el macho de la descripción inicial. Ilustraciones adicionales de esta especie las podemos encontrar en FRUHSTORFER (1916: pl. 103 e); y más recientemente en fotografías a color debidas a LEWIS (1975: pag. 33), SMART (1975: pag. 314-315) y D'ABRERA (1987: pag. 622) por ejemplares depositados en el Museo Británico (Londres). C. L. Vaamonde en esta última Institución reporta, además del ejemplar colombiano aquí estudiado, tres ejemplares peruanos (machos) procedentes de Florida, Río Putumayo e Iquitos, respectivamente. Tratamientos taxonómicos realizados por FRUHSTORFER (1916), ROTHSCHILD (1894, 1896), RÖBER (1916), RYDON (1971), BAUMANN et al. (1977) y DESCIMON (1986), consideran a *A. splendida* como una especie intermedia entre los géneros *Anaea* (*Memphis*) (Hbn) y *Prepona* (Bsd.). RYDON (1971) creó inclusive una tribu: la *Anaeomorphini* para contener este género y especie monotípicos.

REPORTES

Para nuestro país, NIEPELT (1928) descubrió una nueva subespecie: *A. splendida columbiana* con base a dos machos capturados en Mocoa (Putumayo) en octubre de 1927. Uno de ellos (Fgs. 1 & 2) fue designado por P. Ackery (Museo Británico) como sintipo y su rotulación es la siguiente:




Fig.1 Anverso del sintipo de *Anaeomorpha splendida columbiana* Niep. Mocoa, Putumayo. Ejemplar del Museo Británico, Londres.
(foto A. Viloria)

1 ♂, *A. splendida columbiana*, collection Niepelt
Syntype, det. Phil Ackery – 1992 “S. Columbién, Mocoa, Oktober 1927”
“Excoll. H. M. Peebles, B. M. 1947-203”; “coll. Niepelt”
“Excoll. Hill Museum 1931” (B. M. (N. H.)). Ropalocera, slide No 10519

Esta subespecie fue igualmente citada por STICHEL (1939).




Fig. 2 Reverso del mismo espécimen. Mocoa, Putumayo. Ejemplar del Museo Británico de Londres.
(Foto A. Viloria)

HABITAT

En un esfuerzo por redescubrir especies raras de ropalóceros colombianos (SALAZAR, 1993, 1998) nos hemos desplazado a Mocoa y sus alrededores (Enero de 1998) (Fig. 3) para intentar de nuevo registrar esta especie ignorada hasta hace poco. Esta población está rodeada por

na
los
s la

una densa vegetación tropical que bordea los ríos Mocoa, Afán, Rumiaco y Caquetá, que corresponde al bosque subandino de piedemonte ubicado en la vertiente este de la Cordillera Oriental (I. G. A. C., 1983). Se caracteriza por la presencia de familias de plantas pertenecientes a *Moraceae*, *Melastomataceae*, *Leguminosae*, *Arecaceae*, *Anacardiaceae* y helechos que son las dominantes en la región (CUATRECASAS, 1989). Dicha subespecie descrita con base a ligeros caracteres de diferenciación alar es un sinónimo nuevo (SYN. NOV.) de la especie tiponimial. Como dato final, según comunicación personal de K. Willmott, *Anaeomorpha splendida* Roths., es una mariposa rara que ha sido registrada recientemente para el piedemonte oriental de la república del Ecuador (Río Tiputini, Napo) mediante captura con necrocebo de pescado descompuesto. La hembra no se conoce para la ciencia.




Fig. 3 Hábitat de la especie. Mocoa, putumayo Sector Nororiental (Enero/98)

AGRADECIMIENTOS

Especialmente a Carlos L. Vaamonde y Angel Viloría Petit, quienes durante su estancia en el Museo Británico (Londres) suministraron valiosa información y fotografías para este trabajo. Literatura adicional que ayudó a una completa referencia sobre el tema se debió a la bondadosa labor de Udo Luy y Matthias Nüss en Alemania, Henri Descimon en Francia y Carlos L. Vaamonde en Inglaterra. Las salidas de campo tuvieron la grata compañía de E. W. Schmidt-Mumm, Efraín Henao, Yesid A. Calvo, Jorge I. Velásquez - Tibatá, David Acosta y Luis Miguel Constantino.

93,
itar
por

BIBLIOGRAFÍA

- CUATRECASAS, J., 1989.- Aspectos de la vegetación Natural de Colombia (1958).
Pérez - Arbelaezia. 2 (8): 155 - 279
- BAUMANN, H. WITT, TH. & KÖNING, F., 1977.- Zur Tagfalter fauna de Chancha-mayogebietes in Peru. Teil II. Charaxinae. Mitt. Much. Ent. Ges. Münch., 66: 141 - 177
- D'ABRERA, B., 1987.- Genus *Anaeomorpha* Rothsch. Butterflies of the Neotropical Region, 4: 622.
Hill House, Victoria.
- DESCIMON, H., 1986.- Levolution De la coloration chez les Charaxidae néotropicaux: stratégies adaptatives et cladogenése (Lep: Rhop.). Bull. Soc. Zool. Fr., 111: 261 - 295
- FRUHSTORFER, H., 1916.- Artengruppe *Anaeomorpha* (Rothsch.) (in SEITZ ed.).
Die Gross-Schmetterlinge der Erde, 5: 553. Alfred Kernen, Stuttgart.
- I.G.A.C., 1983.- República de Colombia. mapa 1: 500.000 Pl. 5-18, INDERENA, CONIF.
- LEWIS, H. L., 1975. - Las Mariposas del Mundo: 312 pp. Omega, Barcelona
- NIEPELT, W., 1928.- Neue Tagfalter aus Columbien. Int. Ent. Zeitschr., 21(41): 390
- RÖBER, H., 1916.- *Anaea splendida* (Rothsch.) (in SEITZ ed.). Die Gross-Schmetterlinge der Erde, 5: 592.
Alfred Kernen, Stuttgart.
- ROTHSCHILD, L. W., 1894.- On a New Genus and species of Butterfly.. Nov. Zool., 1 (5): 687.
- , 1896.- Descriptions of some New species of Lepidoptera, with
remarks on some previously forms., Nov. Zool., 3 (4): 600. Pl. 13. f. 1.
- RYDON, A. H. B., 1971.- The Systematics of the Charaxidae (Lep: Nymphaloidea).
Ent. Rec. J. var., 83: 219 - 233, 311-316, 336-341, 384-388
- SALAZAR, J. A., 1993.- Una Lista comentada de algunas especies de mariposas de distribución restringida o locales en Colombia.. SHILAP. Rvta. Lepid., 21 (81): 33 - 46
- , 1998.- Un encuentro con *Memphis elina* (Stgr.) (Lep: Nymph.). Tropical News (in press.).
- SMART, P., 1975.- Encyclopedie des Papillons: 269 pp. Elsevier Séquoia, Paris.
- STICHEL, H., 1939.- Genus *Anaeomorpha* Roths. Lepidopterorum Catalogus.
Nymphalidae III. subf. Charaxidinae II.93: 628. W. Junk. 'S Gravenhage