

# El estudio de la percepción y el estigma hacia las personas que usan cannabis: un estado del arte

Llamas-Hernández, D. H. (2025). El estudio de la percepción y el estigma hacia las personas que usan cannabis: un estado del arte. *Cultura y Droga*, 30(40), 115-136.  
<https://doi.org/10.17151/culdr.2025.30.40.6>

Diego Hazael Llamas-Hernández\*

Recibido: 15 de marzo de 2025  
Aprobado: 30 de mayo de 2025


## Resumen

El aumento del uso de cannabis a nivel global y el contexto actual sobre el endurecimiento de las estrategias para reducir el tráfico de sustancias al mismo tiempo que en algunos países de Latinoamérica se intenta implementar políticas para controlar el uso adulto de drogas, hace necesaria la generación de conocimiento científico orientado a la reducción del rechazo y la criminalización de los usuarios de drogas, especialmente de marihuana. El presente artículo tiene como objetivo conocer la manera en que ha avanzado el estudio de la percepción y el estigma hacia los usuarios de cannabis, para ello se realizó una revisión narrativa de documentos científicos publicados entre el 2009 y 2024 en inglés y en español. Se encontró que ambos fenómenos pueden ser estudiados de manera tanto cualitativa como cuantitativa, que los estudios realizados desde el área de la salud suelen estigmatizar más al usuario de cannabis que el uso de la droga; y que es útil profundizar en el estudio de las variables relacionadas con la religiosidad y las normas sociales, sobre todo en el contexto latinoamericano. Además, se recomienda un ejercicio de reflexión acerca del papel de la ciencia como un actor en la construcción de una sociedad que reconozca el derecho al uso adulto de sustancias.

**Palabras clave:** cannabis, estigma, percepción, producción científica

---

\* Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Colima. Docente, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 061. Colima, México. E-mail: [llamashernandez303@gmail.com](mailto:llamashernandez303@gmail.com)

 <https://orcid.org/0000-0002-7240-4317> **Google Scholar**



## The study of perception and stigma to people who use cannabis: a state of the art

### Abstract

The increase in cannabis use globally and the current context of stricter strategies to reduce drug trafficking, coupled with attempts in some Latin American countries to implement policies to control adult drug use, makes it necessary to create knowledge that helps reduce the rejection and criminalization of drug users, especially marijuana users. This paper aims to understand how perception and stigma towards cannabis users has progressed. To this end, a narrative literature review was conducted for scientific documents published between 2009 and 2024 in English and Spanish. It was found that both phenomena can be studied both qualitatively and quantitatively, and that studies carried out in the health field tend to stigmatize cannabis users more than drug use; and that it is useful to delve deeper into the study of variables related to religiosity and social norms, especially in the Latin American context. In addition, a reflection exercise is recommended on the role of science as an actor in building a society that recognizes the right to adult use of substances.

**Key words:** Cannabis, stigma, perception, scientific research

### Introducción

El arraigo del cannabis en la población se consolida de manera sostenida pese a los esfuerzos de los gobiernos y los organismos internacionales de controlar su uso, hasta el punto de convertirse en la droga más utilizada en el mundo, alcanzando un número de 228 millones de usuarios (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2024). En el contexto latinoamericano, la región es considerada el epicentro global de producción y trasiego de sustancias, y cuyos efectos han permeado en aspectos como la gobernabilidad interna o la desintegración del tejido social.

Actualmente países como Colombia, Uruguay, México, Bolivia y Jamaica han llevado a cabo experimentos para controlar el acceso al uso de sustancias psicoactivas como el cannabis, con la intención de garantizar la seguridad de quienes utilizan estas drogas y disminuir los índices de criminalidad al abordar el fenómeno desde

ámbitos alejados del aspecto punitivo (Zepeda Gil, 2024). Sin embargo, la actual presión de Estados Unidos con respecto a la erradicación del tráfico de sustancias a dicho territorio ha obligado a gobiernos de la región a endurecer sus políticas hacia el tráfico de sustancias (Wolf, 2025).

Desde su inicio, las políticas enfocadas en la prohibición del uso de sustancias han derivado también en la estigmatización, la discriminación o la criminalización de las personas que las utilizan; en la actualidad esta situación no ha cambiado, pues las estrategias para la erradicación del tráfico de drogas han situado a la población en medio del conflicto y generan efectos negativos sobre quienes utilizan drogas.

Ante este contexto resulta de utilidad conocer la manera en que las personas conviven con el fenómeno relacionado con el aumento del uso de estas sustancias, a fin de generar conocimiento que contribuya a la instrumentación de estrategias para atender el tema desde perspectivas que vayan más allá de las estrategias punitivas o prohibicionistas, y que vele por la descriminalización de las personas usuarias, así como por la normalización del uso de estas sustancias.

La producción científica en torno al tema resulta de utilidad para brindar un panorama acerca de cómo se ha estudiado la concepción de la población hacia el uso del cannabis, así como los posibles comportamientos o representaciones negativas existentes en torno a la utilización de dicha sustancia, pues los hallazgos obtenidos permiten identificar cómo han evolucionado las indagaciones sobre este tema y qué aspectos quedan por investigarse. En este sentido, se considera pertinente no solo revisar la literatura en torno al estigma hacia las personas usuarias de cannabis, sino también a las investigaciones sobre la percepción hacia el uso y los usuarios de drogas como una manera de inferir una posible formación de concepciones negativas hacia estos grupos sociales.

De acuerdo con Hardyansah *et al.* (2021) la percepción juega un papel importante en la construcción del estigma debido a que “estas percepciones están basados en estereotipos preconcebidos, lo que lleva a la formación de imágenes negativas o inexactas hacia ciertos grupos” (p. 79). En el presente trabajo se entiende por estigmatización al establecimiento aquellos atributos desacreditantes capaces de generar un tratamiento diferente o el rechazo hacia quienes se les otorga dicha marca (Goffman, 2006) y por percepción al proceso de construcción de la experiencia personal o colectiva a través de la memoria y el impacto conductual de un suceso (Rosales Sánchez, 2015).

## Metodología

El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta de los avances en el estudio de la percepción y el estigma hacia los usuarios de cannabis. Para ello se llevó a cabo una búsqueda documental, y revisión narrativa de la literatura en torno a la percepción y el estigma hacia el uso de drogas en general, y hacia el cannabis en particular. Luego de un análisis temático del material consultado se organizaron los hallazgos de acuerdo con tres categorías, que también son tres temas cuyo estudio se propone para analizar el contexto latinoamericano en torno a políticas de descriminalización hacia usuarios de drogas: los estudios enfocados en jóvenes y adultos emergentes; los estudios que involucran aspectos relacionados con la salud o profesionales de dicha área; y las investigaciones donde aparecen elementos de influencia en la percepción o el estigma, tales como las normas sociales o la religiosidad.

Otro aspecto identificado durante el proceso de revisión de literatura tiene que ver con la relativamente poca cantidad de estudios en los que se aborde el tema de la percepción y el estigma únicamente hacia el cannabis, por lo cual se decidió ampliar el criterio a las drogas en general, pero se hace énfasis en el uso del cannabis.

La búsqueda se realizó en plataformas como Redalyc, Dialnet, SciELO y Google Académico. Fueron seleccionados trabajos publicados a partir del año 2009 hasta el 2024, que hayan sido elaborados desde las áreas de ciencias sociales, medicina, psicología y derecho; y donde el idioma con el que haya sido publicado sea en inglés o en español. Los textos en inglés fueron traducidos para garantizar la fluidez de la exposición.

### **Percepción y estigma en jóvenes y adultos emergentes**

Sobre el uso de sustancias psicoactivas García del Castillo (2011) realiza un estudio sobre percepción del riesgo del uso de drogas ilegales con respecto a las sustancias legales. Se encontró que los jóvenes perciben que el consumo de cannabis conlleva riesgos similares al tabaco, que se atribuye al aumento en el nivel de información respecto al uso de estas sustancias; por lo cual establece que “la información a priori, puede actuar como un elemento disuasorio de primer orden, aunque no siempre ejerce este papel, por ejemplo cuando se utilizan argumentos de compensación o se reduce la disonancia cognitiva para lanzarse al consumo” (García del castillo, 2011, p. 123).

Otro estudio realizado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador; Muñoz *et al.* (2018) utilizaron una muestra compuesta por 112 adolescentes de nivel medio (correspondientes al primer, segundo, y tercer año), a los que se les aplicó una encuesta compuesta por treinta reactivos, cuyos resultados fueron que los sujetos perciben en su mayoría al cannabis como una droga muy peligrosa (39 %) o bastante peligrosa (28 %), frente al 13 % que la consideran de peligrosidad regular, o el 8 %, y 7 % que directamente lo perciben como poco o nada peligrosa; al mismo tiempo que lo asocian con la causa de problemas cognitivos o emocionales.

En Chile, Cid Henríquez y Hamilton (2019) realizan un estudio dirigido a estudiantes entre los 15 a los 17 años con el objetivo de conocer la percepción del daño por el uso experimental y frecuente del cannabis. Sobre la percepción del daño se reporta que de forma general los sujetos perciben un riesgo de moderado a bajo. Al medir la percepción de los beneficios, los encuestados indicaron en un 35,1 % que los beneficios son menores que los riesgos, el 38,1 % no está seguro, y el 26,9 % cree que los beneficios son mayores; el 48,5 % no cree que el consumo pueda ayudarlos a afrontar sus problemas emocionales, mientras el 26,5 % no está seguro y el 25 % sí lo cree; el 53 % niega que el consumo les brinde bienestar físico, el 31,3 % no está seguro y el 15,7 % piensa de manera afirmativa; y el 56,3 % no cree que el consumo mejore su rendimiento académico, el 34 % no está seguro, y el 9,7 % sí lo piensa así.

Otro estudio dirigido a adolescentes estudiantes en una escuela pública se realizó por Reyes y Khenti (2019) en la ciudad de Bogotá, Colombia, con el objetivo de “analizar la relación entre la percepción de daños y beneficios asociados al consumo de marihuana y su relación con el actual consumo, así como con la intención de uso en un contexto de cambios regulatorios” (p. 1). Tras la aplicación de este instrumento se identificó que el 46 % está a favor del uso medicinal del cannabis, 16 % para fines médicos y lúdicos, y 26 % reporta no estar de acuerdo con su uso en ninguna circunstancia. A su vez, no existió asociación significativa de la percepción del daño, con la prevalencia en el último mes, ni en el consumo en la vida, contrario a la percepción de beneficios.

Pasquel (2020) realiza una investigación utilizando una muestra compuesta por 68 participantes quienes previo a la aplicación del instrumento recibieron pláticas informativas sobre el uso de cannabis en adolescentes. 34 de los participantes eran profesores de jóvenes de edades entre los 12 y los 15 años, y los otros 34 eran los padres de estos adolescentes.

Tras el análisis de los datos obtenidos se encontró que no hubo una diferencia significativa sobre la información de los participantes sobre el impacto y el contexto actual del cannabis en los adolescentes, pero la percepción del riesgo en ambos grupos sí demostró diferencias, siendo superior por parte de los docentes, a lo que se concluye que suelen ser estos quienes alertan a los padres sobre los peligros del consumo. Además, que “el desequilibrio de estas percepciones, indica la necesidad de modificar las estrategias de los programas de prevención dirigidos a los padres de familia, con un enfoque de mayor concientización del problema” (Pasquel, 2020, p. 120).

### **Percepción y estigma en el área de la salud**

Un estudio realizado en Colombia por Lopera-Londoño *et al.* (2018), con el objetivo de analizar la percepción de 374 estudiantes universitarios pertenecientes a las áreas de química farmacéutica, tecnología en farmacia y medicina, sobre el consumo de productos con extracto de cannabis para uso terapéutico. Los resultados obtenidos indicaron la importancia de que se informe sobre los efectos del uso de esta droga y sus derivados dentro de sus planes de estudios; además de expresar su disposición a usar estos productos en caso de ser necesario. Por último, la mayoría de los sujetos encuestados indicaron estar de acuerdo en el uso del cannabis medicinal.

Un estudio realizado en Nuevo León, en México, por Becerril Gaitán (2018) se analiza la percepción del riesgo en estudiantes de pregrado y posgrado del área de medicina, con el propósito de determinar si el grado académico y la información adquirida en esta rama del conocimiento tiene alguna influencia en cómo se perciben los riesgos terapéuticos del cannabis frente a otros medicamentos. Se encontró que la marihuana medicinal es percibida con un riesgo relativamente bajo, pues los participantes reportaron menor riesgo en el cannabis en comparación a los sedantes, o incluso frente a analgésicos menos potentes, además de que “no se evidenció una percepción de riesgo de marihuana con relación a factores como alcoholismo y tabaquismo” (Becerril Gaitán, 2018, p. 35).

Un estudio realizado en Perú por Urday-Concha *et al.* (2019) aplicó un cuestionario a 86 estudiantes universitarios de enfermería pertenecientes a una institución particular. El objetivo fue conocer la incidencia en el uso y la percepción del cannabis. Los hallazgos obtenidos de esa investigación con relación al consumo de cannabis indican que se trata de la sustancia ilegal más consumida por los encuestados, siendo el 13,9 % de las mujeres y el 57,1 % de los hombres los que indicaron consumirla.

Indicaron una percepción del riesgo por consumo frecuente de cannabis del 87,2 % de los encuestados, contrastado por el 9,3 % que no percibe riesgo en el consumo, lo cual fue considerado como preocupante para los realizadores del estudio.

En Brasil Wink *et al.* (2019) estudian la percepción de médicos psiquiatras y pacientes en recuperación de la adicción a la marihuana, con respecto a la legalización del consumo de dicha sustancia, y lo hacen desde un abordaje del tipo cualitativo. Tras la aplicación de las entrevistas, se obtuvo como resultado que casi todos los profesionales de la salud mental y la mayoría de los pacientes exusuarios de cannabis se pronunciaron en contra de la legalización del uso de cannabis, debido al daño que la medida haría a la salud pública y al tejido social.

Sin embargo, pese a que pudo observarse en las investigaciones anteriores que los sujetos formados en áreas médicas, por lo general tuvieron una percepción positiva del uso del cannabis, en el contexto del tratamiento a los pacientes por uso problemático de sustancias la situación es diferente, pues se mostraron comportamientos orientados al rechazo y la estigmatización.

Un estudio realizado por Pauly *et al.* (2015) explora de manera cualitativa el estigma hacia internos en un hospital ubicado en la Columbia Británica, Canadá, enfocado en el tratamiento de adicciones. Los participantes consisten en 34 sujetos, divididos en: 15 pacientes, y 19 enfermeras y enfermeros. Se identificó la existencia de tres constructos catalogados por los autores como altamente estigmatizantes, y que modifican el trato de los cuidadores: el primero tiene que ver con el uso de drogas como un fracaso individual, el segunda ve al uso de sustancias como una conducta delictiva, y el tercero identifica al consumo de sustancias como una enfermedad y una adicción. Tras el estudio se concluyó que los usuarios de drogas temen a ser internados en centros de atención de adicciones debido al estigma asociado a esta conducta, lo cual termina por ponerlos en una situación de rechazo.

También con un enfoque cualitativo Mora-Ríos *et al.* (2016) realizan una investigación con el objetivo de analizar el estigma y la discriminación hacia 35 sujetos que estén recibiendo tratamiento por uso problemático de sustancias en un centro ubicado en la Ciudad de México. Los datos tras la aplicación de las entrevistas confirmaron un tratamiento discriminatorio y estigmatizante, tanto a los pacientes como a sus familiares. En el caso de los pacientes, se indicaron experiencias que van desde la sobreprotección, el distanciamiento, la exclusión de sus familias o el

ser llamados “marihuanos”, además de abusos físicos y verbales, etc.; en el caso de los familiares se indicó que han sido víctimas de humillaciones, críticas, tratos denigrantes de parte de quienes laboran en instituciones de salud enfocadas en el tratamiento de adicciones, negativa de recibir apoyo, etc.; todas estas apreciaciones fueron confirmadas como ciertas por los trabajadores de la salud entrevistados.

Birtel *et al.* (2017) estudiaron cómo es que el estigma autopercibido influencia a un grupo de 64 pacientes en tratamiento de abuso de sustancias, mediante la aplicación de una encuesta. El hallazgo fue que los participantes tenían una auto percepción del estigma en un grado que iba de moderado a alto, y que tal estigma estaba estrechamente relacionado con problemas emocionales tales como la depresión.

Con un enfoque cualitativo Tirado *et al.* (2019) estudian el nivel en que 15 profesionales que laboran en servicios de atención en adicciones en Medellín, Colombia y su área metropolitana, estigmatizan a quienes usan estas sustancias. Los autores encontraron que “los profesionales de la salud entrevistados estigmatizan a las personas que usan alcohol y drogas, independientemente del contexto en el que trabajen” (Tirado *et al.*, 2019, p. 29) pues del mismo modo que en el estudio realizado por Pauly *et al.* (2015), los sujetos ven al uso de sustancias psicoactivas como producto de una decisión individual, lo cual según Tirado *et al.* (2019) refuerzan los sentimientos moralistas hacia quienes usan drogas y hacen ver la falta de capacitación de los profesionales de la salud con respecto a la comprensión de este fenómeno, y provocan el surgimiento de una barrera que impide el acceso a la rehabilitación, el tratamiento o la prevención del uso problemático de drogas.

Dahkle *et al.* (2024) estudian los efectos del estigma hacia el uso de cannabis en un grupo de pacientes canadienses mayores de sesenta años que usan la marihuana con fines médicos o terapéuticos —concretamente como tratamiento para la ansiedad, la depresión, el insomnio y el dolor crónico—. Se reportó que estos participantes experimentaron estigmatización a pesar de que el uso de esta droga es creciente en Canadá, lo que los obliga a ocultar su condición de usuarios medicinales de cannabis al haber sido difamados o rechazados en otros momentos de sus vidas, pese a que ellos no se consideran a sí mismos como *stoners*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Término empleado de manera coloquial para referirse a quienes usan marihuana.

## **Elementos de influencia en la percepción y el estigma**

Debido a su naturaleza, la religión, las tradiciones y la cultura establecen lineamientos en la forma de actuar de los sujetos, por lo cual se considera importante abordar el uso de sustancias en general —y del cannabis en particular— como una conducta catalogada como una desviación social, es decir, como un comportamiento alejado de aquello que se concibe como social o moralmente aceptable.

Algunos de los estudios revisados mencionan a la religiosidad y a las normas sociales como variables de influencia en diferentes ámbitos: ya sea como elemento que protege a posibles usuarios de drogas (o de cannabis en particular), o como un posible factor que origine actitudes de rechazo o estigmatice, tanto a las drogas como a quienes las utilizan.

### **Normas sociales**

En lo que corresponde al estudio del estigma en México, un estudio realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2009) analizó los efectos del estigma en cien usuarios de drogas junto con los familiares de estos. Los hallazgos indican que los familiares de quienes usan sustancias resultan más estigmatizados que los propios usuarios; de igual modo, los usuarios con tatuajes indicaron sentirse discriminados por causa de estos, sin embargo, eso no les impide sentirse orgullosos de dichos tatuajes. Se concluye que quienes conforman el círculo cercano de personas con problemas de uso problemático de sustancias también suelen ser etiquetadas, y quienes más reciben dicha etiqueta son las madres o parejas de los pacientes, ya que son quienes se encargan del cuidado de estos.

Barry *et al.* (2014) compararon a nivel cuantitativo las actitudes de la población en los Estados Unidos hacia personas con enfermedades mentales en contraposición con quienes presentan el uso problemático de sustancias psicoactivas. Tras la encuesta se encontraron mayores actitudes negativas hacia quienes presentan dependencia de sustancias psicoactivas que a los que tienen padecimientos mentales. La única dimensión en la que los autores no encontraron una información contra las personas con adicciones es aquella que corresponde al potencial de mejora tras la aplicación de un tratamiento; por lo cual concluyen en la necesidad de la búsqueda de aproximaciones enfocadas en la reducción del estigma, que a su vez estimulen a políticas gubernamentales que modifiquen las creencias y el trato hacia pacientes con enfermedades mentales y con problemas de adicciones.

Satterlund *et al.* (2015) estudian la manera en que los usuarios de marihuana medicinal perciben y procesan el estigma de su condición como consumidores de cannabis, y cómo esto afecta en sus interacciones y experiencias con otras personas. Se halló que el estigma fue el problema principal y más recurrente en los usuarios de marihuana medicinal. Este estigma se presenta en las siguientes dimensiones: el estigma de ser un usuario de marihuana medicinal y ser catalogado como “Stoner” en lugar de como paciente, lo cual origina la necesidad de justificar la razón de su consumo y un miedo del usuario a confesarse como un usuario de marihuana con fines terapéuticos ante sus semejantes. También debido a dicho miedo se crea la dificultad de conseguir la sustancia en establecimientos de su localidad.

En el trabajo realizado por Pérez Prada *et al.* (2015) llevaron a cabo un estudio cuantitativo para describir, no solo la percepción del riesgo, sino también los factores que determinan el uso de drogas, en 573 estudiantes de la Universidad de Boyacá en Colombia. Se encontró que la influencia de los pares es determinante, pues los encuestados han sentido presión de parte de sus amistades para el consumo de alcohol hasta embriagarse, o para el consumo de alguna otra droga. Por otro lado, se reportó una baja percepción de riesgo al consumo de alcohol, bebidas energizantes o marihuana, mientras que se percibió como muy peligroso el consumo de sustancias, como la heroína o la cocaína.

A manera de conclusión los autores exponen que los factores de riesgo y de protección para el consumo de sustancias, pueden establecer la probabilidad del uso dependiendo de cada grupo poblacional, por lo que se recomienda el diseño de estrategias útiles para mitigar el problema, dependiendo de los factores. Para los autores, los factores de protección pueden ser: la cohesión familiar, el autoconcepto, los valores, la personalidad, la capacidad de comunicación, etc.

Belvins *et al.* (2017) consideran que la influencia externa vuelve propensos a los adolescentes al uso problemático del cannabis, e identifican dos clases de normativas que influyen este comportamiento: uno se trata de lo que denominan los autores como *injunctive norms* (normas cautelares), o la percepción de la aprobación de otros sobre el uso de la marihuana; y *descriptive norms* (normas descriptivas), o la percepción de la frecuencia en que otros utilizan esta droga. Por tal motivo su estudio se centra en la evaluación de las relaciones existentes entre estas normas y los resultados relacionados al consumo de cannabis en un grupo de 252 adolescentes con uso problemático y que reciben terapia de rehabilitación.

Los autores indican que la percepción relativa a las normas cautelares sufre cambios dependiendo del lapso señalado por estos, mientras que las jerarquías de aprobación del consumo personal y de los amigos no presentó diferencias significativas. A su vez y teniendo como base una temporalidad base de seis meses de consumo regular, las normas descriptivas de adolescentes externos a los grupos de amigos tuvieron un resultado relativamente bajo en comparación con aquellas presentes en los amigos de los sujetos, y se mantuvo la tendencia a reducirse conforme el tiempo se hacía más extenso.

Un estudio realizado por Belvins *et al.* (2018), analiza de manera cuantitativa las normas percibidas, y las actitudes hacia la aprobación del uso de cannabis junto con la percepción del riesgo en un contexto de legalización del consumo de esta droga. Para ello se utilizaron 128 pacientes en tratamiento por consumo problemático de sustancias, todos ellos adolescentes que de forma voluntaria accedieron a participar. Se comprobó que aspectos como la actitud hacia el consumo, la percepción de riesgos, o cuestiones relacionadas con las normas cautelares o la actitud del entorno hacia la utilización de la sustancia, no tuvieron diferencias independientemente de que su uso no esté penalizado.

Otro estudio realizado en Tijuana, esta vez por Pérez-Florian (2018) con el objetivo de contrastar desde un enfoque cuantitativo las percepciones sobre estigma, actitudes discriminatorias, y el uso de tatuajes y su impacto en la calidad de vida de los usuarios de drogas y los familiares de estos (cuyo número de participantes fue de 169 sujetos). Los resultados indican que la conciencia del estigma se hace presente y se refuerza a través del permanente señalamiento, las humillaciones y las burlas. La marginalidad, la falta de atención médica y la persecución de estos sujetos afecta tanto su propio bienestar como el de sus familias, lo que evidencia una vulneración sistemática de los derechos humanos de los usuarios y de su entorno familiar.

Por otro lado, Pilatti *et al.* (2019) estudiaron la relación entre factores de vulnerabilidad, como lo son la percepción del riesgo y las normas sociales, con el consumo de marihuana y alcohol en adultos emergentes, tanto universitarios como no universitarios. Tras la aplicación del estudio, los datos indican que en ambos las normas sociales están relacionados de manera significativa con la frecuencia en el uso de la droga, tanto durante el último mes, como en el último año. Sin embargo, la percepción del riesgo asociado al uso de la marihuana no tuvo una relación significativa con la frecuencia en el consumo de la misma.

Un estudio realizado por Salas García *et al.* (2020) donde se encuestaron a 19,815 estudiantes universitarios de nivel licenciatura, los autores reportaron cuatro hallazgos en lo relativo a: 1) que los sujetos encuestados no cambiarían su condición de “no consumidores” a pesar de la legalización del uso lúdico del cannabis; 2) los sujetos se declaran en favor del uso del cannabis para fines médicos o terapéuticos, pero en contra de su consumo lúdico; 3) con respecto a las acciones que deben adoptarse desde el Estado hacia el consumo de esta droga para garantizar el control en su uso, los sujetos se declararon en favor de que sea el gobierno la entidad encargada de la venta controlada del cannabis, tanto para fines médicos, como para fines recreativos; y 4) que en lo referente a la percepción sobre el aumento en el consumo, las mujeres encuestadas fueron las que más suponen que habrá un incremento en el uso de esta sustancia en caso de legalizarse, en comparación de los encuestados varones.

Ante los hallazgos de este estudio se concluyó en la necesidad del diseño de programas orientados a la prevención del aumento en el consumo de marihuana en los jóvenes, pues estos demostraron percibir la posibilidad de aumento en el consumo en caso de ser legalizada la droga, debido a la ausencia de mecanismos de control diseñados por el gobierno, frente a los mecanismos adoptados en otros países, por lo que sugieren la revisión de los resultados de su estudio previo a la aprobación de leyes o reglamentos en lo relativo al tema de la legalización del uso de cannabis.

En un estudio realizado por Skliamis *et al.* (2020) se analiza la manera en que los usuarios de cannabis de distintos países de Europa (con diferentes políticas respecto al uso de esta sustancia) perciben, experimentan y responden a la estigmatización de la misma. Se usó una muestra de 1,225 usuarios de cannabis con un rango de edad entre los 18 y los 40 años provenientes de siete países diferentes dentro del continente europeo. Se reportó que la mayoría de los sujetos no perciben alguna clase de rechazo por sus círculos cercanos; sobre la devaluación percibida se encontró que los usuarios de cannabis siguen siendo asociados con estereotipos negativos; y finalmente los autores explican que, de acuerdo con los datos sobre la alienación del sujeto, dicho comportamiento varía según la manera en que el usuario de cannabis responde a la estigmatización que percibe.

Camberos-Barraza *et al.* (2023) estudian de forma cuantitativa la importancia de la información científica en la percepción del uso de cannabis, en el contexto de la legalización del uso de esta droga. Se usó una muestra de 3,162 sujetos que habitaban en el estado de Sinaloa. Previo a la realización del cuestionario los participantes

fueron evaluados sobre sus creencias hacia la marihuana, para luego ofrecerles una plática informativa sobre los efectos y los mitos de dicha droga. Los resultados demostraron que, luego de realizada la sesión informativa, se dio una modificación en las creencias hacia el cannabis, por lo cual los autores concluyen que la correcta información de la población puede garantizar el diseño de políticas más efectivas hacia el tema de drogas.

## **Religiosidad**

Una investigación realizada por Palamar *et al.* (2013) tuvo como objetivo examinar cuantitativamente la estigmatización<sup>2</sup> en 1021 adultos entre los 18 y los 25 años habitantes de la ciudad de Manhattan (Nueva York), consumidores de sustancias estupefacientes; cómo esta estigmatización explica el uso habitual de estas sustancias en la población estudiada, y el papel que desempeñan las creencias religiosas en el control del impulso de consumir sustancias ilícitas. Sobre el uso de cannabis se indicó que: 1) existe un estigma hacia quienes utilizan el cannabis, 2) la exposición de los no consumidores hacia usuarios de cannabis puede predecir el surgimiento de nuevos usuarios, y 3) la religión sirve como un elemento protector de que los sujetos no lleguen a ser consumidores de cannabis.

Flórez *et al.* (2015) estudiaron de manera cuantitativa las actitudes hacia la adicción al uso de sustancias en una muestra de 1,235 personas de ascendencia latina y afroamericana, integrantes de grupos religiosos de Los Ángeles. Se encontró que las personas latinas presentaban mayor puntaje de estigma hacia el uso problemático, sobre todo aquellos que tenían un bajo dominio del inglés o que nacieron fuera de Estados Unidos. Los autores reconocen que la naturaleza del estudio impide que sea visible una diferencia en el grado de estigmatización, pues todos los participantes eran miembros activos de iglesias, por lo que infieren que si los no nacidos dentro de Estados Unidos estigmatizan más el uso de drogas es debido a las normas sociales de los países de origen.

Dempsey *et al.* (2016) realizaron un estudio a una muestra de 4,131 estudiantes universitarios provenientes de Dinamarca, Alemania, España, Turquía, Eslovaquia y el Reino Unido, y cuyo objetivo es el de realizar un análisis de las percepciones del consumo de cannabis en estudiantes universitarios europeos y las actitudes que ejercen presión en sus pares para el consumo de esta droga. Los autores reportaron

---

<sup>2</sup> Tanto pública como personal.

que los estudiantes alemanes tienen una percepción positiva con respecto al consumo de la marihuana, y una creencia de que sus pares aprueban el uso de dicha sustancia en comparación con los del resto de países, seguido por España, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Eslovaquia y Turquía. Al mismo tiempo las personas encuestadas consideraron que tanto la percepción del consumo en sus pares, como la percepción de las actitudes frente al consumo son mayores que aquellas que tienen dichos sujetos.

Un aspecto interesante es que, según los datos sociodemográficos recolectados para la investigación, en el apartado correspondiente a las creencias religiosas de los participantes, fueron los sujetos provenientes de Alemania, España, Dinamarca, Bélgica, Reino Unido, Eslovaquia y Turquía en ese orden, los que indicaron no tener creencias religiosas; lo cual podría explicar hasta cierto punto el nivel de apertura presente con respecto al uso de esa droga, debido al hecho de no seguir una norma *ad-hoc* a la moral presente en alguna religión en particular.

Pedersen *et al.* (2016) estudiaron la diferencia presente en las percepciones del daño de estudiantes de Reino Unido y Noruega con respecto al uso de drogas legales diferenciado de las ilegales, refiriéndose más específicamente a la distinta percepción que se tiene del alcohol y el tabaco con el cannabis. Los participantes del Reino Unido indicaron un consumo regular de tabaco y una prevalencia del consumo de cannabis superior a los provenientes de Noruega, quienes indicaron un mayor consumo de alcohol. A su vez, ambos grupos mostraron percepciones similares con respecto al daño ocasionado por cada una de las drogas estudiadas. Además, fue un punto de interés el factor religioso, pues al igual que en Dempsey *et al.* (2016), fue visible una mayor percepción del daño en las participantes pertenecientes a las doctrinas del islam y el cristianismo, en comparación del resto.

Un estudio realizado por Jara-Concha y Cumsille (2019) tuvo como objetivo realizar un análisis a nivel cuantitativo de las actitudes de los residentes de una localidad en Concepción, Chile, hacia quienes presentan un consumo problemático de sustancias. Los resultados demostraron que “las actitudes predominantes hacia las personas con abuso de drogas son ambivalentes, cuando se trata del alcohol y la marihuana, mientras que las actitudes hacia personas con abuso de cocaína y pasta base son predominantemente negativas” (Jara-Concha y Cumsille, 2019, p. 7). Además, al igual que sucedió en el estudio realizado por Palamar *et al.* (2013), encontraron a la religiosidad como una variable que influye de manera determinante en la actitud

hacia el consumo de sustancias, el aspecto religioso puede ser un elemento protector o que suele estigmatizar actitudes que consideran negativas.

Ajayi & Somefun (2020) examinaron de manera cuantitativa los factores que influyen en el uso recreativo de drogas en 784 estudiantes universitarios en Nigeria. Se reportó que la religiosidad fue uno de los factores de protección hacia el uso recreativo de sustancias, debido a que el pertenecer a comunidades religiosas reducía en un 43% la probabilidad de usar drogas, además de que mientras más frecuente fuera la asistencia a actividades tales como misas o cultos, menor era dicha probabilidad. Por otro lado, se encontró que eran las mujeres quienes más sufren estigmatización por utilizar drogas.

Un estudio con enfoque cuantitativo realizado por Clobes & Gagnon (2023) analiza los factores demográficos que influyen las actitudes hacia el uso recreativo de cannabis en 645 participantes estadounidenses mayores de 18 años. Los hallazgos indicaron que uno de los factores que influyen una visión estigmatizante hacia el uso de cannabis es la religión. Los autores encontraron que los participantes que indicaron profesar alguna religión, además de tener una visión negativa del cannabis, también pasaban menos tiempo con personas usuarias de esta droga o que inclusive no apoyaban la legalización del consumo (ya sea lúdico o terapéutico) de la droga.

## **Conclusiones**

Luego de esta revisión de la literatura, se encontró que la producción científica en torno al estudio de la percepción y el estigma hacia el uso de sustancias —incluido el cannabis— parece estar atravesando un proceso de aumento del interés por el análisis del factor de las normas sociales y la religiosidad como catalizadores del estigma.

En el caso de las investigaciones en las que se explora la percepción del uso de sustancias en profesionales de la salud se observó una aparente disminución en el interés por indagar el fenómeno basándose únicamente en la cantidad de literatura disponible. Además, se identificó una aparente ambivalencia en la percepción de los profesionales de la salud hacia el cannabis, contrapuesto con el trato que se da a los pacientes en tratamiento de adicciones, puesto que, pese a que se apreciaba un cierto grado de aceptación del uso de dicha droga, las investigaciones enfocadas en el estudio del estigma reportaban un trato estigmatizante hacia las personas que presentan una situación de uso problemático de sustancias.

Si bien está claro que un usuario de sustancias no es lo mismo que una persona con problemas de dependencia al uso de drogas, estas investigaciones hacen evidente la discrepancia entre estigma hacia el uso y el estigma hacia los usuarios debido a la distinción entre la percepción hacia las sustancias, incompatible con la estigmatización a los pacientes con dicho problema de dependencia a drogas. En caso de trabajarse el fenómeno desde la perspectiva del personal de salud se recomienda resaltar la importancia en estudiar la percepción de los sujetos hacia el cannabis, contrapuesto con las actitudes dirigidas a los usuarios de cannabis.

Sobre la literatura en la que se aborda el tema del uso de drogas en población joven o adultos emergentes, se encontró que entre la población estudiada la percepción del riesgo o del daño es relativamente baja, por lo que puede inferirse una baja estigmatización hacia los usuarios de sustancias. Sin embargo, al ser considerado este grupo etario como población vulnerable se propone que el estudio de este tema desde una perspectiva enfocada en la promoción del uso adulto y no desde la idea del uso de sustancias como un comportamiento negativo.

Sobre los trabajos en los que se investiga la presencia de elementos catalizadores del estigma, es decir, que influyen en la idea que se tiene sobre las drogas y que, además, pueden evitar que una persona se inicie en el uso, resulta interesante que las variables de religiosidad y de normas sociales ejercen una influencia en la percepción, el estigma y la propensión a que una persona se vuelva usuaria, ya sea de drogas en general, o específicamente de cannabis.

Respecto a la cuestión de las normas sociales, Becker (2009) establece que la transgresión del sistema de normas sociales deviene en una etiqueta de desviado que tiene consecuencias para la persona etiquetada. Bajo esta lógica puede considerarse que las normas sociales constituyeron un factor determinante para que, en los estudios sobre estigma hacia usuarios de drogas comparados con personas con enfermedades mentales, se encontrara un nivel de desacreditación mayor hacia quienes utilizan sustancias, al igual que en aquellos donde los participantes mencionan la existencia de tatuajes.

En el caso de los estudios realizados en México se encontró la particularidad de que tomaron en cuenta la presencia de tatuajes como un factor estigmatizante asociado al uso de sustancias psicoactivas, tendieron a atribuir como factor de riesgo la vulnerabilidad producto de las condiciones de pobreza de los sujetos. Asimismo, no

solo se enfocan en estudiar a los usuarios de drogas, sino también a los familiares, quienes, de acuerdo con los estudios consultados, también son víctimas de estigma y discriminación.

En el caso de México, los estudios se enfocaron principalmente en evaluar la situación de discriminación o estigma existente en Tijuana y en la Ciudad de México. Puede inferirse que en otras entidades federativas de México el fenómeno sea similar; sin embargo, requieren investigaciones que confirmen esta hipótesis.

Según la tradición criminológica el acto de trasgredir las leyes y las normas sociales, al ser tomado como una decisión individual son considerados como posibles actos de maldad (Guzmán Valenzuela, 2009), y debido a la situación de criminalización del uso de drogas, quienes las utilizan también son tomados, sino como delincuentes, sí como personas que van en contra de lo establecido.

Sobre la variable de la religiosidad, de acuerdo con Palamar *et al.* (2013) la religiosidad constituye el principal factor que vincula valores y conductas, al mismo tiempo que el estigma es dependiente de la religiosidad y la exposición, por lo que el tema relacionado con normas sociales y con la religiosidad se considera que puede llegar a ser más relevante y necesario para el estudio del estigma hacia el uso de drogas o particularmente hacia el uso del cannabis.

Debido a esto se resalta la importancia de seguir estudiando la influencia de estas variables, sobre todo en el contexto de los países de América Latina, pues el impacto que ha tenido en la zona el problema del tráfico de drogas, así como al hecho de que luego del medio oriente, el sur y sudeste asiático y el África subsahariana, es la región más religiosa (Evans *et al.* 2025), puede otorgar resultados significativos y útiles para abordar el tema desde una perspectiva orientada a promover la inclusión y la no discriminación de las personas usuarias de sustancias.

En el aspecto técnico-metodológico se encontró que, a diferencia de las investigaciones centradas en la percepción, el estigma hacia los usuarios de cannabis constituye un tema que aún requiere mayor atención investigativa. Se trata de un tema que puede ser medido tanto a nivel cualitativo como cuantitativo; no obstante, los estudios cualitativos tienen la particularidad de visibilizar con mayor claridad el proceso de etiquetamiento hacia los usuarios, lo cual fue recurrente en la mayoría de los artículos consultados con esta orientación metodológica, especialmente en aquellos

referidos a personas ingresadas en centros para el tratamiento del uso problemático de sustancias.

Otro tema que vale la pena retomar tiene que ver con la poca disponibilidad de las investigaciones en las que solamente se estudie el cannabis, dado la gran mayoría de los documentos disponibles la analizaron junto con el resto de sustancias ilegales. Por ello, se considera necesario reflexionar acerca de los posibles actos de estigmatización que llegan a suceder de manera quizás involuntaria y/o inconsciente por parte de quien investigue estos temas, ya que tratar el tema ubicando al cannabis dentro del mismo espectro de las drogas ilegales puede ralentizar el proceso de construcción de un consenso desde la ciencia en el que se vea a esta sustancia al mismo nivel que el resto de drogas legales: potencialmente dañinas si no se modera el uso, pero no peligrosas al punto de causar daño a la sociedad.

En un contexto en el que el uso de drogas va en aumento y se ha comprobado la ineficacia de las estrategias punitivas del control de sustancias, es necesario que la ciencia se cuestione a sí misma acerca de su papel en la construcción de conocimientos que contribuyan a una sociedad inclusiva y respetuosa del principio del libre desarrollo de la personalidad como uno de los derechos fundamentales del ser humano.

## Referencias

- Ajayi, A. I., & Somefun, O. D. (2020). Recreational drug use among Nigerian university students: Prevalence, correlates and frequency of use. *PLoS ONE*, *15*(5), 1-14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232964>
- Barry, C. L., McGinty, E. E., Pescosolido, B. A., & Goldman, H. H. (2014). Stigma, discrimination, treatment effectiveness, and policy: Public views about drug addiction and mental illness. *Psychiatric Services*, *65*(10), 1269-1272. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.201400140>
- Becerril Gaitán, D. A. (2018). *Percepción del riesgo del uso terapéutico de la marihuana* [trabajo de especialización, Universidad Autónoma de Nuevo León]. <http://eprints.uanl.mx/19348/7/19348.pdf>
- Belvins, C. E., Marsh, E., Banes, K. E., Stephens, R. S., Walker, D. D., & Roffman, R. A. (2018). The implications of Cannabis Policy Changes in Washington on Adolescent Perception of Risk, Norms, Attitudes, and Substance Use. *Substance Abuse: Research and Treatment*, *12*, 1-6. <https://doi.org/10.1177/1178221818815491>

- Belvins, C. E., Walker, D. D., Stephens, R. S., Banes, K. E., & Roffman, R. A. (2017). Changing social norms: The impact of normative feedback included in motivational enhancement therapy on cannabis outcomes among heavy-using adolescents. *Addictive Behaviors*, 1-21. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.08.030>
- Becker, H. (2009). *Outsiders: Hacia una sociología de la desviación*. Siglo XXI Editores.
- Birtel, M. D., Wood, L., & Kempa, N. J. (2017). Stigma and social support in substance abuse: Implications for mental health and well-being. *Psychiatry Research*, 252, 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.01.097>
- Camberos-Barraza, J., Osuna-Ramos, J. F., Rábago-Monzón, Á. R., Quiñonez-Angulo, L. F., González-Peña, H. R., Pérez-Ramos, A. A., Camacho-Zamora, A., López-Lazcano, H., Valdez-Flores, M. A., Angulo-Rojo, C. E., Guadrón-Llanos, A. M., Picos-Cárdenas, V. J., Norzagaray-Valenzuela, C. D. y De la Herrán-Arita, A. K. (2023). Scientific facts improve cannabis perception and public opinion: Results from Sinaloa, México. *Scientific Reports*, 13. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-44185-5>
- Cid Henríquez, P. y Hamilton, H. (2019). Percepción del daño y beneficios de adolescentes sobre uso de marihuana, Provincia de Concepción, Chile. *Texto y Contexto Enfermagem*, (28), 1-12. <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-CICAD-16-9>
- Clobes, T. A., & Gagnon, M. (2023). How Demographic Factors Impact Attitudes Toward the Recreational Use of Cannabis. *Cureus*, 15(1). <https://www.cureus.com/articles/126274-how-demographic-factors-impact-attitudes-toward-the-recreational-use-of-cannabis#!>
- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2009). *Estigma y discriminación hacia las y los usuarios de drogas y sus familiares*. [https://www.conapred.org.mx/documentos\\_cedoc/E05-2009-1Co.pdf](https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E05-2009-1Co.pdf)
- Dahkle, S., Butler, J. I., Hunter, K. F., Toubiana, M., Kalogirou, M. R., Shrestha, S., Devkota, R., Law, J., & Scheuerman, M. (2024). The Effects of Stigma: Older Persons and Medicinal Cannabis. *Qualitative Health Research*, 1-15. <https://doi.org/10.1177/10497323241227419>
- Dempsey, R. C., McAlaney, J., Helmer, S. M., Pischke, C. R., Akvardar, Y., Bewick, B. M., Fawcner, H. J., Guillen-Grima, F., Stock, C., Vriesacker, B., Van Hal, G., Salonna, F., Kalina, O., Orosova, O., & Mikolajczyk, R. T. (2016). Normative perceptions of cannabis use among European university students: Associations of perceived peer use and peer attitudes with personal use and attitudes. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 77(5), 740-748. <https://doi.org/10.15288/jsad.2016.77.740>
- Evans, J., Lesage, K., Miner, W., Starr, K., J., & Corichi, M. (2025, May 6). Religious importance and religious affiliations. *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/religion/2025/05/06/religious-importance-and-religious-affiliation/>

- Flórez, K. R., Pitkin Derose, K., Breslau, J., Griffin, B. A., Haas, A. C., Kanouse, D. E., Stucky, B. D., & Williams, M. V. (2015). Acculturation and Drug Use Stigma Among Latinos and African Americans: An Examination of a Church-Based Sample. *Journal of Immigrant Minority Health, 17*, 1607-1614. <https://doi.org/10.1007/s10903-015-0161-9>
- Goffman, E. (2006). *Estigma: la identidad deteriorada*. Amorrortu Editores.
- García del Castillo, J. A. (2011). Sobre la percepción social del consumo de drogas a través de sus actores y sus observadores. *Salud y Drogas, 11*(2), 121-126. <https://www.redalyc.org/pdf/839/83922546001.pdf>
- Guzmán Valenzuela, K. (2009). La escuela clásica de la criminología y algunos de sus planteamientos actuales. *Cuadernos de Posgrado en Psicología UV, 62*, 62-70.
- Hardyansah, R., Saptura, R., & Negara, D. S. (2021). Social Perception and Stigma: Creating an Inclusive and Equal Society. *Journal of Social Science Studies, 1*(1), 79- 86. <https://jos3journals.id/index.php/jos3/article/view/34>
- Jara-Concha, P. y Cumsille, F. (2019). Actitudes de residentes urbanos hacia las personas con abuso de drogas en cinco distritos de la comuna de Concepción, Chile. *Texto Contexto Enfermagem, 28*, 1-12. <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-CICAD-6-20>
- Lopera-Londoño, C., Pino-Marín, D., Ceballos, M. y Amariles, P. (2018). Percepción de los estudiantes de los programas de Química Farmacéutica, Tecnología en Regencia de Farmacia y Medicina de la Universidad de Antioquia frente al uso terapéutico de los cannabinoides. *Revista de la Universidad Industrial de Santander, 50*(3), 215-223. <https://doi.org/10.18273/revsal.v50n3-2018006>
- Mora-Ríos, J., Ortega-Ortega, M., & Medina-Mora, M. E. (2016). Addiction-Related Stigma and Discrimination: A Qualitative Study in Treatment Centers in Mexico City. *Substance Use y Misuse, 1-10*. <https://doi.org/10.1080/10826084.2016.1245744>
- Muñoz, R. E., Domínguez Castro, S. E., Riofrío Cruz, M. E. y Ronquillo Morán, F. (2018). Percepciones sobre el consumo de marihuana en alumnos de bachillerato de un colegio de la ciudad de Guayaquil. *Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento, 3*(2), 165-182.
- Pasquel, K. (2020). Maestros alertas vs padres dormidos. Percepción del riesgo de los diferentes personajes educativos, ante el consumo de cannabis en la adolescencia. En A. Rial Boubeta, P. Gómez Salgado, y M. Isorna Folgar (Eds.), *Nuevas aportaciones sobre el consumo de cannabis desde las ciencias sociales y de la salud* (pp. 116-121). Andavira.
- Palamar, J. J., Halkitis, P. N., & Kiang, M. V. (2013). Perceived public stigma and stigmatization in explaining lifetime illicit use among emerging adults. *Addiction Research and Theory, 21*(6), 516-525. <https://psycnet.apa.org/doi/10.3109/16066359.2012.762508>

- Pauly, B., McCall, J., Browne, A. J., Parker, J., & Mollison, A. (2015). Toward Cultural Safety: Nurse and Patient Perceptions of Illicit Substance Use in a Hospitalized Setting. *Advances in Nursing Science*, 38(2), 121-135. <https://doi.org/10.1097/ans.0000000000000070>
- Pedersen, W., Grip Fjaer, E., Gray, P., & von Soest, T. (2016). Perceptions of harms associated with tobacco, alcohol, and cannabis among students from the UK and Norway. *Contemporary Drug Problems*, 43(1), 47-61. <https://doi.org/10.1177/0091450916638578>
- Pérez-Floriano, L. R. (2018). Estigma, símbolos corporales y discriminación de personas consumidoras y sus familiares. *Cultura y Droga*, 23(25), 67-84. <https://doi.org/10.17151/culdr.2018.23.25.5>
- Pérez Prada, M. P., Barreto Bedoya, P., Roa Cubaque, M. A. y Rubiano Díaz, G. H. (2015). Percepción del riesgo y factores asociados al consumo de drogas legales e ilegales en estudiantes de la Universidad de Boyacá. *Enfoques*, 1(2), 83-102. <https://doi.org/10.24267/23898798.167>
- Pilatti, A., Michelini, Y., Rivarola Montejano, G., Berberian, M., Carrizo, M. y Marcos Pautassi, R. (2019). Consumo de alcohol y marihuana en universitarios y no universitarios: relación con factores de vulnerabilidad. *Quaderns de Psicologia*, 21(2), e1528. <https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1528>
- Reyes, M. F. y Khenti, A. (2019). Percepción de daños y beneficios de la marihuana y su relación con la intención de uso y consumo en adolescentes colombianos. *Texto y Contexto Enfermagem*, 28, 1-13. <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-CICAD-15-8>
- Rosales Sánchez, J. J. (2015). Percepción y experiencia. *Episteme*, 35(2), 21-36. [https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0798-43242015000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es](https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-43242015000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es)
- Salas García, B., De San Jorge Cárdenas, X., Beverido Sustaeta, P., Ortiz León, C. y Cortaza Ramírez, L. (2020). Percepción y consumo de marihuana: efectos del proceso de legalización en estudiantes universitarios. *AVFT- Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 39(8), 967-975. [http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev\\_aavft/article/view/21316](http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_aavft/article/view/21316)
- Satterlund, T. D., Lee, J. P., & Moore, R. S. (2015). Stigma among California's Medical Marijuana Patients. *Journal of Psychoactive Drugs*, 47(1), 10-17. <https://doi.org/10.1080/02791072.2014.991858>
- Skliamis, K., Benschop, A., & Korf, D. J. (2020). Cannabis users and stigma: A comparison of users from European countries with different cannabis policies. *European Journal of Criminology*, 19(6), 1-18. <https://doi.org/10.1177/1477370820983560>

- Tirado, A. F., Calderón Vallejo, G. A., Restrepo Escobar, S. M., Vásquez Gallón, V. y Orozco Giraldo, I. C. (2019). Estigma social de profesionales de la salud hacia personas que usan drogas. *Psicología em Pesquisa, 13*(1), 22-32. [https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1982-12472019000100003](https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-12472019000100003)
- Urday-Concha, F., Gonzáles-Vera, C., Peñalva Suca, L. J., Pantigoso-Bustamante, E. L., Cruz Sánchez, S. H. y Pinto-Oppe, L. (2019). Percepción de riesgos y consumo de drogas en estudiantes universitarios de enfermería, Arequipa, Perú. *Revista Electrónica Enfermería Actual en Costa Rica, (36)*. <http://dx.doi.org/10.15517/revenf.v0i36.33416>
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2024). *Informe mundial sobre las drogas 2024*. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2024-key-findings-conclusions.html>
- Wink, G. A., Pilla Della Mía, C., & Rossi, T. (2019). Cannabis legalization: Perceptions of psychiatrists and recovering users. *Trends in Psychology, 27*(3), 721-733. <https://doi.org/10.9788/TP2019.3-09>
- Wolf, Z. B. (6 de diciembre de 2025). La “guerra contra las drogas” parecía terminada. Donald Trump la reinició. *CNN en Español*. <https://tinyurl.com/3dcsa3as>
- Zepeda Gil, R. (January 17, 2024). Why Colombia sees legalising drugs as the way forward. Here’s what’s being proposed. *The Conversation*. <https://theconversation.com/why-colombia-sees-legalising-drugs-as-the-way-forward-heres-whats-being-proposed-220908>